

Vaccin Base

Le vaccin de base protège contre 3 maladies virales **mortelles** et très contagieuses :

Rhinotrachéite : herpèsvirus félin qui cause des infections respiratoires avec de la fièvre, des éternuements, une congestion nasale, un écoulement nasal et des conjonctivites. Elle se transmet par contact direct avec un chat infecté ou avec les objets contaminés par ses sécrétions.

Panleucopénie : virus qui cause de graves troubles digestifs et qui affaiblit fortement le système immunitaire du chat. Le virus peut survivre très longtemps dans l'environnement et contaminer les chats qui entrent en contact avec un milieu ou des objets contaminés.

Calicivirus : virus qui cause des infections respiratoires importantes (semblables à la rhinotrachéite) avec des ulcères dans la bouche. Il se transmet facilement entre les chats, notamment par la salive et les sécrétions.

Le vaccin est recommandé pour tous les chats, peu importe leur mode de vie.

On administre ce vaccin dès les premières semaines de vie, avec 1 ou 2 rappels aux 4 semaines, puis un rappel après 1 an. Ensuite, le vaccin doit être renouvelé aux 3 ans.

Vaccin Rage

Ce vaccin protège contre le virus de la rage, un virus qui attaque le cerveau et les nerfs. La rage provoque des changements de comportement (agressivité, errance ou abattement), une salivation excessive et une paralysie progressive. Il n'existe pas de traitement contre cette maladie, la **mort** est inévitable.

Elle se transmet surtout par la salive d'un animal infecté (morsure) et elle est transmissible aux humains. Le vaccin est recommandé pour tous les chats, peu importe leur mode de vie.

On vaccine généralement le chaton vers 16 semaines, avec un rappel 1 an plus tard. Ensuite, le vaccin est renouvelé aux 3 ans.

Vaccin Leucémie

Ce vaccin protège contre le virus de la leucémie féline (FeLV). Ce virus affaiblit progressivement le système immunitaire. Les chats infectés deviennent ainsi plus vulnérables aux infections, aux maladies chroniques et à certains cancers.

La leucémie se transmet par contact direct avec les sécrétions d'un chat infecté. La vaccination est particulièrement recommandée pour les chats qui ont accès à l'extérieur ou qui peuvent entrer en contact avec des chats inconnus,

On vaccine généralement le chaton vers 16 semaines, avec un rappel 1 an plus tard. Ensuite, le vaccin est renouvelé aux 3 ans.

