

CLINIQUE VÉTÉRAINAIRE

DES VOLTIGEURS

Pourquoi vacciner ?

Le vaccin consiste à exposer le corps à une version inoffensive d'une bactérie ou d'un virus afin d'entraîner le système immunitaire à reconnaître cet agent nocif, à produire des anticorps et à le combattre.

L'objectif est de réduire les risques d'infection, la sévérité des symptômes, le risque de mortalité et la transmission aux autres animaux et humains.

Quand est-ce qu'on vaccine ?

La vaccination débute entre 6 à 8 semaines d'âge.

Il faut faire un rappel du vaccin toutes les 4 semaines, jusqu'à l'âge de 16 semaines.

Ensuite, le vaccin doit être renouvelé à chaque année (ou aux 3 ans *).

Pourquoi donner plusieurs doses à mon chiot/chaton ?

Les bébés reçoivent des anticorps de leur mère qui les protègent au début de leur vie. Avec le temps, les anticorps maternels diminuent pour laisser place aux propres anticorps que votre animal produira.

Pendant cette transition, les chiots et les chatons sont plus à risque de développer des maladies. Le fait de les vacciner à ce moment permet de garder un taux d'anticorps suffisamment élevé afin de rester protégé.

La première dose de vaccin apprend au système immunitaire à reconnaître le virus/bactérie. Les 2e et 3e doses permettent de stimuler progressivement l'immunité, de sorte à ce qu'il y ait plus d'anticorps, des défenses plus fortes et une réponse plus rapide.

Pourquoi donner un rappel vaccinal à chaque année ?

Avec le temps, le système immunitaire perd sa mémoire et ne se souvient plus que le virus/bactérie est dangereux. Ainsi, la protection du corps contre l'agent néfaste diminue. Faire un rappel à chaque année permet de « réveiller » la mémoire immunitaire et de maintenir une bonne protection sur le long terme.

il existe maintenant certains vaccins pour lesquels le rappel doit être fait aux 3 ans



CLINIQUE VÉTÉRINAIRE

DES VOLTIGEURS

Effets secondaires

La grande majorité des animaux réagissent très bien à la vaccination. Cela dit, des effets secondaires peuvent parfois survenir. Ils sont généralement légers et temporaires, et durent 24 à 48 heures. On retrouve de la fatigue, de la fièvre, une diminution de l'appétit, une sensibilité au site d'injection et des selles légèrement molles.

Si ces signes persistent plus de 48 heures, il est recommandé de contacter votre vétérinaire.

Très rarement, une réaction allergique plus grave peut survenir : visage enflé, difficulté à respirer, démangeaisons intenses, vomissements ou diarrhées important(e)s. Cela nécessite une intervention vétérinaire immédiate.

Vous avez des questions sur les vaccins de votre animal ?

Notre équipe est là pour vous guider et établir le programme de vaccination le mieux adapté au mode de vie de votre compagnon.

CONTACTEZ-NOUS

873-382-0305

info@veterinairedesvoltigeurs.com

www.cliniqueveterinairedesvoltigeurs.com

